

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НЕКОММУТАТИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Денис В. Юрьев

Динамическая обратная задача теории представлений, постановка которой воходит к классической работе Е.Вигнера об определяемости коммутационных соотношений на квантовомеханические величины по квантовым уравнениям движения, проиллюстрирована на простейших примерах.

Теория представлений имеет по меньшей мере две стороны, одна из них связана с *прямой задачей теории представлений*, задачей описания представлений заданного алгебраического объекта. Будучи в целом завершённой для классических алгебраических объектов (алгебр и супералгебр Ли) эта проблематика вступила в очередную ренессанс, вызванный открытием значительного числа новых алгебраических структур в современной квантовой теории поля (квантовые группы, алгебры Замолодчикова, операторные алгебры квантовой теории поля и их разновидности, W -алгебры и их обобщения, категории бордизмов и шлейфы конечномерных и бесконечномерных групп, гомотопические алгебры Ли, алгебры Баталина–Вилковыского и т.д.). Вторая сторона связана с *обратной задачей теории представлений*: по имеющейся совокупности операторов описать "корректный" алгебраический объект, ими представляемый (см. напр. [1]). Эта задача допускает и более общее расширенное толкование (см. [2]).

Различные иллюстрации к обратной задаче теории представлений, а также ее связь с некоммутативной геометрией [3], рассматривались в [4,1]. Цель данной работы — вычлнить "динамическую" параллель к обратной задаче, восходящую к классической работе Е.Вигнера [5].

Динамическая обратная задача теории представлений (задача Вигнера). Для заданной системы операторных дифференциальных уравнений

$$(*) \quad \frac{\partial}{\partial t} \hat{X}_i(t) = f_i(\hat{X}_1(t) \dots \hat{X}_n(t)) \quad (1 \leq i \leq n)$$

найти алгебраический объект $\mathfrak{A}$, порождённый генераторами e_i и однопараметрическую группу γ_t автоморфизмов $\mathfrak{A}$ такие, что при любом (надлежащим образом определенном) операторном представлении T алгебраического объекта $\mathfrak{A}$ группа γ_t определяется системой уравнений (*), коль скоро $T(e_i) = \dot{X}_i(0)$.

Алгебраический объект $\mathfrak{A}$ может быть ассоциативной алгеброй полиномиального роста, хотя и другие варианты возможны (например, парастатистики [5,6] или соотношения в изотопических парах [7,8]). В дальнейшем, однако, указанные возможности не будут рассматриваться.

Практически наибольший интерес представляют бесконечные системы операторных уравнений, отвечающие нелинейным операторным уравнениям в частных производных квантовой теории поля (напр. уравнениям саён–Гордон или Лиувилля, рассматривавшимся с указанной точки зрения в качестве характерных примеров ленинградской школы акад. Л.Д.Фаддеева в рамках квантового метода обратной задачи, группой из Высшей Нормальной Школы в Париже под руководством проф.Ж.-Л.Жервэ, коллективом отдела квантовой теории поля в Институте Стеклова в Москве). Однако, с методологической точки зрения целесообразно рассматривать и конечные системы операторных уравнений, отвечающие обыкновенным дифференциальным уравнениям квантовой механики.

Определение 1. *Динамическим освобождением скрытых симметрий* называется сопоставление заданной системе операторных дифференциальных уравнений (*) пары $(\mathfrak{A}, \gamma_t)$, где $\mathfrak{A}$ — ассоциативная алгебра, порожденная генераторами $e_1, \dots, e_n$ так, что отображение симметризации Веёля $w : S(H) \mapsto \mathfrak{A}$ ($H = \text{span}(e_1, \dots, e_n)$) является изоморфизмом линейных пространств, а γ_t — однопараметрическая группа автоморфизмов алгебры $\mathfrak{A}$ такая, что при любом операторном представлении T ассоциативной алгебры $\mathfrak{A}$ группа γ_t определяется системой (*), коль скоро $T(e_i) = \hat{X}_i(0)$. Динамическое освобождение симметрий называется *гамильтоновым*, если существует такой элемент h алгебры $\mathfrak{A}$, что система (*) приводится к виду $\frac{\partial}{\partial t} \hat{X}_i = [\hat{H}, \hat{X}_i]$ ($\hat{H} = T(h)$).

С алгеброгеометрической точки зрения динамическое освобождение скрытых симметрий заключается в интерпретации заданной системы операторных дифференциальных уравнений как потока (динамической системы) на некоммутативном алгебраическом многообразии [3]. Необходимо отметить, что в отличие от коммутативного случая данная интерпретация не является тривиальной и самоочевидной. Заметим также, что динамические системы на некоммутативных многообразиях возникают естественным образом и в рамках некоммутативной дифференциальной геометрии Алана Конна [9].

Отметим, что интерпретация квантовой конформной теории поля, тесно связанной с упомянутыми выше уравнениями квантовой теории поля, как бесконечномерной некоммутативной геометрии была дана автором в работе [10]. Однако, подчеркнем, что в конкретных квантовополевых задачах зачастую используются ассоциативные алгебры $\mathfrak{A}$ с фиксированным набором элементов e_i таких, что $T(e_i) = \hat{X}_i(0)$, но не порождаемых ими. Как правило, в качестве алгебры $\mathfrak{A}$ удобно рассматривать алгебры Веёля от коэффициентов свободных полей (т.н. *представление свободных полей*), универсальные обертывающие алгебры алгебр Каца–Мури или некоторые их q -деформации. Тем самым подобные конструкции являются естественными альтернативами динамическому освобождению скрытых симметрий при решении динамической обратной задачи теории представлений.

Рассмотрим простейшие примеры динамического освобождения скрытых симметрий.

Пример 1 ($n = 2$, f_1 и f_2 — линейные функции). В этом случае система (*) имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \hat{X} = a\hat{X} + b\hat{Y} \\ \frac{\partial}{\partial t} \hat{Y} = c\hat{X} + d\hat{Y} \end{cases}$$

Без ограничения общности можно считать, что матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ приведена к жордановой нормальной форме. Пусть матрица A диагональна: $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$. Система (*) записывается как

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \hat{X} = \lambda \hat{X} \\ \frac{\partial}{\partial t} \hat{Y} = \mu \hat{Y} \end{cases}$$

Будем искать соотношения на $\hat{X}$ и $\hat{Y}$ в виде $[\hat{X}, \hat{Y}] = \hat{f}(\hat{X}, \hat{Y})$, где $\hat{f}(\hat{X}, \hat{Y}) = \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} a_{ij} \hat{X}^i \hat{Y}^j$. Условие сохранения динамикой указанных соотношений имеет вид

$$(\lambda + \mu) \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} a_{ij} \hat{X}^i \hat{Y}^j = \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} a_{ij} (i\lambda + j\mu) \hat{X}^i \hat{Y}^j$$

или

$$\sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} a_{ij} (\lambda(i-1) + \mu(j-1)) \hat{X}^i \hat{Y}^j = 0.$$

Как следствие, коэффициенты a_{ij} отличны от нуля только для тех i и j , для которых выражение $\lambda(i-1) + \mu(j-1)$ обращается в нуль.

Возможны пять случаев:

- 1) Если λ и μ несоизмеримы, или λ и μ соизмеримы, одного знака и $\lambda \neq \mu$, то $[\hat{X}, \hat{Y}] = \alpha \hat{X} \hat{Y}$ или, иными словами, $\hat{X} \hat{Y} = q \hat{Y} \hat{X}$ (соотношения двумерной квантовой плоскости [3]).
- 2) Если $\lambda = \mu$, то $[\hat{X}, \hat{Y}] = \alpha \hat{X}^2 + \beta \hat{X} \hat{Y} + \gamma \hat{Y}^2$ (алгебра с квадратичными соотношениями, порожденная двумя образующими [3,11,12]).
- 3) Если $\lambda = 0$, $\mu \neq 0$, то $[\hat{X}, \hat{Y}] = P(\hat{X}) \hat{Y}$, или, иными словами, $\hat{Y} \hat{X} = R(\hat{X}) \hat{Y}$ (алгебры подобного типа рассматривались в [11,12,13]).
- 4) Если $\lambda + \mu = 0$, то $[\hat{X}, \hat{Y}] = \sum_{k \geq 0} a_k \hat{X}^k \hat{Y}^k$. Этот случай отвечает классической задаче Вигнера [5] об однозначности восстановления квантовых коммутационных соотношений по уравнениям квантовой динамики. В частности, данный случай включает т.н. q -коммутационные соотношения $\hat{X} \hat{Y} - q \hat{Y} \hat{X} = 1$ (см. напр. [14]).
- 5) Если λ и μ соизмеримы, $\lambda = l\nu$, $\mu = m\nu$, $l < 0$, $m > 0$, $l + m \neq 0$, то $[\hat{X}, \hat{Y}] = \sum_{k \geq 0} a_k \hat{X}^{1+km} \hat{Y}^{1-kl}$.

Отметим, что динамическое освобождение скрытых симметрий является гамильтоновым лишь в случае канонических коммутационных соотношений, являющихся подслучаем случая 4, и линейных коммутационных соотношений, являющихся подслучаем случая 3 с $R(x) \equiv 1$.

Пусть теперь матрица A имеет вид нетривиальной жордановой клетки $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, изучим, когда существует динамическое освобождение скрытых симметрий с алгеброй $\mathfrak{A}$, задаваемой линейными или квадратичными коммутационными соотношениями на генераторы. Система (*) имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \hat{X} = \lambda \hat{X} \\ \frac{\partial}{\partial t} \hat{Y} = \lambda \hat{Y} + \hat{X} \end{cases}$$

- 1) При $\lambda \neq 0$ не существует алгебры $\mathfrak{A}$ динамически освобожденных скрытых симметрий с линейными коммутационными соотношениями на генераторы.
- 2) Квадратичные коммутационные соотношения в алгебре $\mathfrak{A}$ динамически освобожденных скрытых симметрий представляются в виде $[\hat{X}, \hat{Y}] = a\hat{Y}^2$. Соответствующее динамическое освобождение скрытых симметрий не является гамильтоновым.

Пример 2 ($n = 2$, f_1 и f_2 — однородные квадратичные функции). Система (*) имеет вид:

$$(**) \quad \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \hat{X} = a\hat{X}^2 + b\frac{\hat{X}\hat{Y} + \hat{Y}\hat{X}}{2} + c\hat{Y}^2 \\ \frac{\partial}{\partial t} \hat{Y} = d\hat{X}^2 + e\frac{\hat{X}\hat{Y} + \hat{Y}\hat{X}}{2} + f\hat{Y}^2 \end{cases}$$

Изучим, когда данная система операторных уравнений допускает динамическое освобождение скрытых симметрий с алгеброй $\mathfrak{A}$, определяющие коммутационные соотношения которой однородные линейные или квадратичные функции, а также когда динамическое освобождение скрытых симметрий является гамильтоновым.

- 1) Система операторных уравнений (**) допускает динамическое освобождение скрытых симметрий с алгеброй $\mathfrak{A}$, определяющие коммутационные соотношения которой линейны, тогда и только тогда, когда

$$\begin{cases} ac + bf + f^2 = 0 \\ a^2 + ae + df = 0 \end{cases}$$

При этом $[\hat{X}, \hat{Y}] = \alpha\hat{X} + \beta\hat{Y}$, и имеет место пропорция $\alpha : \beta = -a : f$. Динамическое освобождение скрытых симметрий гамильтоново, $\hat{H} = p\hat{X}^2 + q\frac{\hat{X}\hat{Y} + \hat{Y}\hat{X}}{2} + r\hat{Y}^2$ и имеет место пропорция $p : q : r = df : af : ac$.

- 2) Система операторных уравнений (**) допускает динамическое освобождение скрытых симметрий с алгеброй $\mathfrak{A}$, определяющие коммутационные соотношения которой квадратичны, тогда и только

тогда, когда $a:d = b:e = c:f$. При этом $[\hat{X}, \hat{Y}] = \alpha \hat{X}^2 + \beta \frac{\hat{X}\hat{Y} + \hat{Y}\hat{X}}{2} + \gamma \hat{Y}^2$, и имеют место пропорции $a:d:\alpha = b:e:\beta = c:f:\gamma$. Динамическое освобождение скрытых симметрий гамильтоново, $\hat{H} = p\hat{X} + q\hat{Y}$ и $p:q = -a:d = -b:e = -c:f$.

Отметим, что система (*) допускает динамическое освобождение скрытых симметрий как с линейными, так и с квадратичными определяющими коммутационными соотношениями в алгебре $\mathfrak{A}$, если $b = -(a + c)$, $d = a$, $e = b$, $f = c$. Линейные случаи задаются соотношениями $[\hat{X}, \hat{Y}] = a\hat{X} + b\hat{Y}$ и гамильтонианом $\hat{H} = \frac{1}{2}(\hat{X} + \hat{Y})^2$, квадратичные — соотношениями $[\hat{X}, \hat{Y}] = a\hat{X}^2 - (a + c)\frac{\hat{X}\hat{Y} + \hat{Y}\hat{X}}{2} + c\hat{Y}^2$ и гамильтонианом $\hat{H} = \hat{X} - \hat{Y}$.

Интересные возможности возникают в случае системы из трех операторных дифференциальных уравнений с линейной или квадратичной правой частью, однако, он не содержит идеологически ничего принципиально нового, если ограничиваться алгебрами $\mathfrak{A}$ динамически освобожденных скрытых симметрий с линейными или квадратичными перестановочными соотношениями на генераторы.

Отметим, что и при любом конечном n исследование возможности динамического освобождения скрытых симметрий, описываемых линейными или квадратичными перестановочными соотношениями, в системах n операторных дифференциальных уравнений с линейной или квадратичной правой частью сводится к вопросу о существовании нетривиальных решений перепределенных систем линейных уравнений с последующей проверкой тождеств Якоби и не представляет теоретических или вычислительных трудностей в отличие от случая сильно нелинейных перестановочных соотношений (см. [12]).

Список литературы

- [1] Juriev D., Topics in hidden symmetries. E-print (LANL Electronic Archive on Theor. High Energy Phys.): *hep-th/9405050* (1994).
- [2] Юрьев Д.В., Характеристики пар операторов, гибриды Ли, скобки Пуассона и нелинейная геометрическая алгебра. Report RCMPI-95/02 (1995) and e-print (SISSA Electronic Archive on Funct. Anal.): *funct-an/9411007* (1994).
- [3] Manin Yu.I., *Topics in noncommutative geometry*, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1991.
- [4] Juriev D., Setting hidden symmetries free by the noncommutative Veronese mapping, J. Math. Phys. 35 (1994) 5021-5024.
- [5] Wigner E.P., Phys. Rev. 77 (1950) 711-712.
- [6] Ohnuki Y., Kamefuchi S., *Quantum field theory and parastatistics*, Springer, 1982.
- [7] Juriev D., Topics in isotopic pairs and their representations, Theor. Matem. Fiz. 00 (1995) 00-00 and e-print (Texas Electronic Archive on Math. Phys.): *tp-arc/94-267* (1994).
- [8] Juriev D., Classical and quantum dynamics of noncanonically coupled oscillators and Lie superalgebras, Russian J. Math. Phys. 00 (1995) 00-00 and e-print (SISSA Electronic Archive on Funct. Anal.): *funct-an/9409003* (1994).
- [9] Connes A., Non-commutative differential geometry. Publ. Math. IHES 62 (1986).
- [10] Юрьев Д.В., Квантовая конформная теория поля как бесконечномерная некоммутативная геометрия. Успехи Матем. Наук 46(3) (1991) 115-138.
- [11] Карасев М.В., Маслов В.П., Назаёкин В.Е., Алгебры с общими перестановочными соотношениями. I, II. Современ. пробл. матем. Новейш. достижения. Т.13. М., ВИНТИ, 1979.

- [12] Карасев М.В., Маслов В.П., Нелинейные скобки Пуассона. Геометрия и квантование. М., Наука, 1991.
- [13] Латушкин Ю.Д., Степин А.М., Успехи Матем. Наук 46 (1991) 85.
- [14] Кулиш П.П., Контракция квантовых алгебр и q -осцилляторы. Теор. Матем. Физ. 86(1) (1991) 157-160.

"THALASSA AITHERIA" RESEARCH CENTER FOR MATHEMATICAL PHYSICS AND INFORMATICS
E-mail address: `denis@juriev.msk.ru`